

Información general:

El láser V-BEAM es un láser decolorante pulsado (Dye laser) y su longitud de onda es de 595nm. Es utilizado para el tratamiento de lesiones vasculares superficiales de la piel, principalmente en malformaciones vasculares como nevus flameus y hemangiomas, rosácea y cicatrices.

Es necesario que informe previo a la sesión, sobre posibles alergias medicamentosas, antecedentes de vitíligo, alteraciones de la coagulación, uso de medicamentos o cualquier otra cosa que considere pertinente.

Requisitos:

- La piel no puede estar bronceada ni con autobronceante.
- Se debe evitar la exposición al sol durante 4-6 semanas previas y posteriores al tratamiento.
- La zona a tratar debe estar indemne, sin heridas, alergias o herpes activo. Se debe avisar al médico tratante en caso de herpes facial.
- Está contraindicado con pacientes con vitíligo, en pacientes en tratamiento con Roacnetan (hasta 6 meses terminado el tratamiento), con tratamiento hematológico y fotosensibilizantes.
- Este tratamiento se debe suspender durante embarazo y lactancia.

Riesgos y complicaciones:

- Los riesgos del láser dependen de las condiciones previas del paciente y del procedimiento en sí.
- Puede ocurrir daño ocular si se exponen los ojos al láser, lo cual es evitado con el uso **obligatorio** de lentes específicos durante todo el procedimiento.
- Puede presentar reacción purpúrica (moretones), edema, dolor y eritema inmediatamente después del procedimiento. Cuando se utilizan dosis elevadas, pueden quedar incluso zonas con costras o erosiones.
- Puede ocurrir hipo o hiperpigmentación, habitualmente transitoria.
- Ocasionalmente puede producirse una cicatriz en la zona tratada
- Existe un porcentaje menor de pacientes que no responden al láser, lo que no es posible predecir.

Cuidados posteriores:

- Se debe evitar la exposición solar por 4-5 semanas posterior al tratamiento, o hasta que su médico lo indique.
- Uso de bloqueador solar 3 veces al día si estará en casa u oficina o cada 3 horas si saldrá al exterior.
- Si la zona tratada es la cara, dormir semisentado la 1era noche.
- Se recomienda el uso de cold pack fríos (dejar en la puerta del refrigerador) de 1-3 días, según necesidad.