

GCL 1.13: Indicador relacionado con el uso de anticoagulantes orales	
Nombre del indicador:	Porcentaje de exámenes Protrombina TAC con INR en rango terapéutico
Cálculo	Proporción de resultados Protrombina TAC con INR entre 1,9 y 3,9 en relación al total de Protrombina TAC realizados, expresado en porcentaje.
Fórmula	$(N^{\circ} \text{ de resultados Protrombina TAC con INR entre 1,9 y 3,9} / N^{\circ} \text{ total de resultados Protrombina TAC}) \times 100$
Fuente de obtención de datos	Sistema informático propio de laboratorio
Frecuencia y modalidad de presentación de datos	mensual con información de porcentaje
Frecuencia de análisis	Anual
Umbral	$\geq 60\%$
Responsable de recolección de datos:	Hematólogo encargado del tratamiento anticoagulante

Mes	Total Protrombina TAC	Total INR entre 1,9 y 3,9	% en rango
ene-17	407	286	70,3
feb-17	355	238	67,0
mar-17	470	320	68,1
abr-17	385	280	72,7
may-17	413	298	72,2
jun-17	406	286	70,4
jul-17	401	274	68,3
ago-17	417	283	67,9
sep-17	376	279	74,2
oct-17	390	273	70,0
nov-17	416	296	71,2
dic-17	401	278	69,3
Total	4837	3391	70,1

