

SOLUCIÓN INTEGRAL DE SALUD

CONSIDERACIONES MÉDICAS GENERALES:

INCLUSIONES GENERALES:

- Paciente evaluado previamente por médico staff y que cumpla con los criterios definidos en el protocolo médico.
- Cirugía electiva.
- Paciente se realizará previo a su hospitalización todos los exámenes clínicos necesarios para su diagnóstico. (ya que están fuera de paquete).
- Paciente que en la intervención quirúrgica no tengan “hallazgos intraoperatorios” que impliquen reparación de una lesión no definida previamente en el paquete.

EXCLUSIONES GENERALES:

- Pacientes portadores de patologías crónicas severas o descompensadas.
- Pacientes en general que están cursando algún cuadro de otra patología, en el momento de su intervención quirúrgica.
- Pacientes con obesidad IMC mayor a 30.
- Pacientes con patología siquiátricas.
- Pacientes con sospecha de cáncer asociado a la cirugía a efectuar.
- Pacientes que rechazan transfusiones. (evaluación caso a caso).
- Pacientes con inmunodepresión.
- Pacientes portadores de marcapaso.
- Pacientes con antecedentes de y/o alteraciones de la coagulación.
- Pacientes con lesiones neurológicas.
- Edades definidas en las exclusiones por diagnóstico.

HERNIA INGUINAL ADULTO (código: 1802003):

PATOLOGIA: Herniación indolora, reductible.

Criterios de inclusión específicas Clínicas.	Criterios de exclusión específica Clínicas
<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes adultos de 18 a 65 años ASA I o II • Hernia inguinal unilateral electiva tipo I y II. Ecotomografía de no más de 3 meses que muestre la existencia de una hernia inguinal exclusiva. • Operadas por técnica con incisión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hernias complicadas. • Hernias recidivadas • Pacientes que han recibido tratamiento radiante en la zona a intervenir o han tenido una cirugía de otra índole en la región inguinal • Pacientes con Obesidad IMC ≥ 35

HERNIA INGUINAL PEDIATRICA (código: 1802003):

PATOLOGIA:

Criterios de inclusión específicas Clínicas.	Criterios de exclusión específica Clínicas
<ul style="list-style-type: none"> • Niños mayores de 2 meses de edad hasta 15 años cronológica con hernia inguinal unilateral, ASA I o II. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prematuros menores a 50 semanas post concepción • Necesidad de exploración abierta o laparoscópica contralateral. • Desnutridos • Dermatitis del pañal moderada a severa • Infección de la zona operatoria • Hernia atascada o estrangulada • Derivación ventrículo peritoneal